

扁桃周囲炎・扁桃周囲膿瘍

新知台耳鼻咽喉科

〒478-0064 知多市新知台二丁目4番30
TEL 0562-54-2700

● 症状


通常、のどの痛みから始まり、半日から一日で急に悪化します。食べ物が食べられない、唾液が飲み込めないなどのつらい症状が起こり、多くは片側で非常に強く感じます。また、高熱が出ることも多く、関節痛や頭痛が起こることもあります。

● 原因

かぜの原因であるウイルスや細菌が、扁桃腺に感染して炎症を起こし、さらに、その炎症が扁桃腺の周辺へと広がることで、のど全体が腫れていきます。強い炎症が起きた場合になります。

● 当院での治療

炎症が軽ければ**抗菌剤の内服**のみで治りますが、多くの場合は、**抗菌剤の点滴**を行う必要があります。また、この炎症の強い状態が続くと、**扁桃周囲膿瘍**といって扁桃腺の外側に膿がたまる状態になることも。そうなると、たまった膿を抜く必要があり、市民病院などに入院して治療を受けて頂くこととなります。



扁桃腺が腫れ、さらに扁桃腺の外側まで腫れます。

● 生活上、気をつけていただくこと

痛くて食べられない場合もありますので、脱水状態にならないよう、まめに水分を摂取するようにして下さい。また、何度もこの病気になるようでしたら、扁桃腺を取る手術を検討します。



★ 症状が急に変わることもあります。疑問な点や困った事がありましたら、なるべく早目におたずねください。

おだいじに
なさってください。

