

インフルエンザ検査結果

新知台耳鼻咽喉科

〒478-0064 知多市新知台二丁目4番30

TEL 0562-54-2700

検査結果 インフルエンザ 陽性 (A・B)

● 症状

潜伏期間は**1～3日**で、突然の発熱と悪寒、頭痛、関節痛、だるさなどの全身症状がみられ、鼻水、せき、のどの痛みなどの風邪の症状を伴うこともあります。

お子さんでは脳炎や脳症、高齢者では肺炎などの合併症を起こし重症化することも、まれにあります。

● 当院での治療

インフルエンザの薬には、内服薬「**タミフル**」、吸入薬「**リレンザ**」「**イナビル**」の3種類があります。

どの薬も、発熱後**48時間以内**に使用しないと効果が出にくいといわれています。

他にも対症的に解熱剤、消炎剤、せき止めを処方することもあります。

● 登園・登校について

熱が下がっても感染力は持続するため、解熱後も自宅安静が必要となります。

解熱後、体調面に問題がなければ、再度受診する必要はありません。

お子さまが感染・発症すると、ご家族も大変です！

学校保健安全法の規定では、お子さまがインフルエンザにかかった場合、「**発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日間(幼児は解熱後3日間)**」は**出席停止**となります。

そのため、看病するご家族は大変！インフルエンザワクチンは、ご家族そろっての接種がおすすめです。

幼児 (園児まで)		発症	解熱	発症後2日目 解熱後1日目	発症後3日目 解熱後2日目	発症後4日目 解熱後3日目	発症後5日目	▶	登園!	
小学生 以上		発症	発症後1日目	発症後2日目	発症後3日目	解熱	発症後5日目 解熱後1日目	解熱後2日目	▶	登校!

● 注意点

熱が下がっても「**タミフル**」「**リレンザ**」は**5日間**しっかりと使用し周りの方への感染を防ぎましょう。また、解熱剤は医師から処方された薬(**アセトアミノフェン製剤**)以外は使用しないでください。



★ 症状が急に変わることもあります。疑問な点や困った事がありましたら、なるべく早目におたずねください。

おだいじに
なさってください。

